

## 令和8年度から、妊婦 RS ウイルスワクチンが定期接種化されます

### ＜RSウイルス感染症とは＞

RSウイルスは特に小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、**1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が、少なくとも1度は感染するとされています。**感染すると、2～8日の潜伏期間ののち、発熱、鼻汁、咳などの症状が数日続き、初めて感染した乳幼児の約7割は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、喘鳴（ゼーゼーと呼吸しにくくなること）や呼吸困難、さらに細気管支炎の症状が出るなど重症化することがあります。

RS ウイルスの流行には季節性があり、新型コロナウイルスの流行以前は秋冬に流行が見られましたが、近年は夏に流行がみられています。**接触・飛沫感染により伝播するため、手洗いや手指衛生といった基本的な感染対策が有効です。治療は症状に応じた治療（対症療法）が中心で、重症化した場合には酸素投与、点滴、呼吸管理などを行います。**

### ＜母子免疫ワクチンとは＞

生まれたばかりの乳児は免疫の機能が未熟で、自力で十分な量の抗体をつくることができないとされています。母子免疫ワクチンとは、**妊婦が接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時から病原体に対する予防効果を得ることができるワクチン**です。

### ＜接種対象＞

接種時点で、妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方

接種については、妊婦健診を受けている病院の主治医の先生ともよくご相談ください。

### ＜接種回数と接種スケジュール等＞

回数(接種方法)	妊娠ごとに1回(筋肉内に接種)
スケジュール	<b>妊娠28週0日から36週6日までの間に1回接種</b> ※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。
ワクチンの種類	アブリスボ®(ファイザー社)

### ＜注意が必要な方＞

- 接種によって妊娠高血圧症候群の発症リスクが上がるという報告もあるため、妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師に判断された方や、今までに妊娠高血圧症候群と診断された方
- 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方
- 免疫不全と診断されている方や近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- アブリスボ®の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方 等

### ＜接種できない方＞

- 明らかな発熱を呈している方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- アブリスボ®の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方 等

## 《母子免疫ワクチンの効果》

	生後90日時点	生後180日時点
RSウイルス感染による医療受診を必要とした下気道感染症の予防	6割程度の予防効果	5割程度の予防効果
RSウイルス感染による医療受診を必要とした重症下気道感染症(※)の予防	8割程度の予防効果	7割程度の予防効果

※医療機関への受診を要する RS ウイルス関連気道感染症を有する RS ウイルス検査陽性の乳児で、多呼吸・SpO2 93%未満・高流量鼻カニユラまたは人工呼吸器の装着・4 時間を超える ICU への収容・無反応・意識不明のいずれかに該当と定義しています。

## 《ワクチンの安全性》

ワクチン接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシーがみられることがあります。

発現割合	主な副反応
10%以上	疼痛*(40.6%)、頭痛(31.0%)、筋肉痛(26.5%)
10%未満	紅斑*、腫脹*
頻度不明	発疹、蕁麻疹

\*ワクチンを接種した部位の症状

また、ワクチン接種による妊娠高血圧症候群の発症リスクに関して、薬事承認において用いられた臨床試験では、妊娠高血圧の発症リスクは増加しませんでした。海外における一部の報告では、妊娠高血圧症候群の発症リスクが増加したという報告もあるものの、交絡因子等の影響の可能性があることから解釈に注意が必要であるとされています。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

## 《他のワクチンとの同時接種・接種間隔》

医師が特に必要と認めた場合は、他のワクチンと同時接種が可能です。

ただし、海外の知見で、百日咳菌の防御抗原を含むワクチンとの同時接種で、百日咳菌の防御抗原に対する免疫応答が低下するとの報告があり、接種間隔等については医師と相談してください。

## 《接種を受けた後の注意点》

- ワクチンの接種後30分程度は安静にしてください。
- 体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
- 当日の激しい運動は控えるようにしてください。

## 《予防接種健康被害救済制度について》

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づくRSウイルスワクチン予防接種によって引き起こされた健康被害が、予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。対象は接種を受けたご本人及び出生した児となります。

ご不明点などございましたら、下記までご連絡ください。

お問合せ：下郷町役場健康福祉課健康係 0241-69-1199