

## 望ましい予防接種の受け方

R5年4月現在(下郷町作成)

No.	月 齢 ・ 年 齢	予 防 接 種 名	生	不活化	注意
①	2か月	ヒブ	初 回 1 回 目	○	
②		ロタ(1価2回接種)	1 回 目	○	遅くとも3か月半まで
③		小児用肺炎球菌	初 回 1 回 目	○	
④		B 型 肝 炎	1 回 目	○	
⑤		四 種 混 合	1 期 初 回 1 回 目	○	
⑥	3か月	ヒブ	初 回 2 回 目	○	①初回1回目から20日～56日以内
⑦		ロタ(1価2回接種)	2 回 目	○	※5価で3回接種の場合は生後4か月で接種
⑧		小児用肺炎球菌	初 回 2 回 目	○	③初回1回目から27日以上の間隔をあけて
⑨		B 型 肝 炎	2 回 目	○	④1回目から27日以上の間隔をあけて
⑩	4か月	四 種 混 合	1 期 初 回 2 回 目	○	⑤初回1回目から20日～56日以内
⑪		ヒブ	初 回 3 回 目	○	⑥初回2回目から20日～56日以内
⑫		小児用肺炎球菌	初 回 3 回 目	○	⑧初回2回目から27日以上の間隔をあけて
⑬	5か月	四 種 混 合	1 期 初 回 3 回 目	○	⑩初回2回目から20日～56日以内
⑭		B C G		○	5～8か月で接種
⑮	7 か 月	B 型 肝 炎	3 回 目	○	④1回目から139日以上(約5か月)の間隔をあけて
⑯	1 1 か 月	ヒブ	追 加	○	⑪初回3回目から7～13月以内
⑰	1 2 か 月	小児用肺炎球菌	追 加	○	⑫初回3回目から60日以上で1歳を過ぎてから
⑱	1 2 か 月	水 痘	初 回	○	
⑲	1 2 か 月	麻しん風しん混合	1 期	○	
⑳	1 歳 5 か 月	四 種 混 合	1 期 追 加	○	⑬1期初回3回目から6か月～1年6か月あけて
㉑	1 歳 6 か 月	水 痘	追 加	○	⑱初回から6か月～12か月
㉒	3 歳 0 か 月	日 本 脳 炎	1 期 初 回 1 回 目	○	
㉓	3 歳 0 ～ 1 か 月	日 本 脳 炎	1 期 初 回 2 回 目	○	㉒1期初回1回目から6日～28日以内
㉔	4 歳 1 か 月	日 本 脳 炎	1 期 追 加	○	㉓1期初回2回目から1年過ぎてから
㉕	保 育 所 年 長	麻しん風しん混合	2 期	○	
㉖	9歳(小学3年)	日 本 脳 炎	2 期	○	㉔1期追加から5年(9歳になってから)
㉗	11歳(小学5年)	二 種 混 合	2 期	○	
㉘	13歳(中学1年)	子 宮 頸 がん	1 回 目	○	
㉙		子 宮 頸 がん	2 回 目	○	㉘1回目から1か月の間隔をあけて ※9価ワクチンを15歳になる前に受け、2回目を5か月以上あけて接種した場合、2回で終了
㉚		子 宮 頸 がん	3 回 目	○	㉘1回目から6か月の間隔をあけて

※上記月齢・年齢は望ましい標準的な接種期間です。かかりつけ医と相談しながら忘れず接種しましょう。  
定期接種(無料)の対象となる期間や注意点の詳細は、冊子「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。